

# Chirurgische Händedesinfektion

## Die Chirurgische Händedesinfektion nach der Einreibemethode gem. EN 12791



Hände bei Bedarf\* mit einer milden Waschlotion 1 Minute waschen, anschließend Hände sorgfältig abspülen.

\* Kann bei optisch sauberen Händen ggf. entfallen (s. RKI 2007)



Gründlich mit einem Einmalhandtuch oder sterilem Tuch abtrocknen.



Das Händedesinfektionsmittel aus dem Spender (Hebel mit dem Ellenbogen betätigen) in die trockene hohle Hand geben.



Das alkoholische Einreibepreparat über einen Zeitraum von 1 bis 3 Minuten (je nach Präparat) in einzelnen Portionen einreiben. Zunächst Hände und Unterarme bis einschließlich Ellenbogen desinfizieren.



Anschließend den halben Unterarm und die Hände und im letzten Schritt nur noch die Hände desinfizieren. Über die gesamte Applikationszeit müssen die Hände gut angefeuchtet bleiben. Die letzte Portion bis zur Auftrocknung einreiben. Einreibetechnik zur hygienischen Händedesinfektion beachten.



Nach dem Desinfektionsvorgang Hände und Unterarme nicht mehr abtrocknen.

**Achtung:**

Nicht mit feuchten Händen die Handschuhe anziehen.